

# Glycerin Montavit



Омекотяващо средство при запек

# Glycerin Montavit

## Suppositories

### Състав

Една супозитория от 1 грам съдържа 0,8 грама безводен глицерин.  
Една супозитория от 3 грама съдържа 2,4 грама безводен глицерин.  
Други съставки: стеаринова киселина, натриев хидроксид, вода.

### Показания

Glycerin Montavit suppositories са омекотяващо средство за лечение на констипация, подходящо за бебета, кърмачета, деца и възрастни.

### Механизъм на действие

Glycerin Montavit suppositories помагат за евакуацията на чревното съдържимо по няколко начина:

- Рефлексът на евакуация (на дефекация) се активира чрез контакт на супозиторията с лигавицата на дебелото черво.
- **Глицеринът е хиперосмотичен лаксатив**, който привлича водата от червата и така се **хидратират и омекотяват втвърдените изпражнения**.
- **Глицеринът е и слаб дразнител**, който стимулира контракцията на мускулите на червата и така **подпомага перисталтиката**.
- **Глицеринът има смазващо (лубрикиращо) действие**, чрез което се **улеснява преминаването на изпражненията**.
- Супозиторията улеснява изхождането при пациенти приковани към легло и омекотява изпражненията при пациенти с болезнени анални оплаквания, например хемороиди или болка при дефекация (анални фисури).

Супозиторията до голяма степен се запазва, защото тя не се топи и следователно напуска ректума в непроменена форма с изпражненията.

**Glycerin Montavit suppositories са бърз, безопасен и ефективен начин за облекчаване на симптомите при запек.**

### Бременност и кърмене

Glycerin Montavit suppositories могат да се използват по време на бременност и кърмене.

### Употреба

Поставете супозиторията в ануса. Началото на действието е в рамките на 1 час.

### Дозировка

Кърмачета и малки деца: по 1 супозитория от 1 грам  
Възрастни в упорити случаи: по 1 супозитория от 3 грама

### Режим на отпускане

медицинско изделие | наличност само в аптеките

### Опаковки

Glycerin Montavit 1 g, 10 супозитории

Glycerin Montavit 3 g, 10 супозитории

Допълнителна информация за безопасна употреба, предпазни мерки, взаимодействия и нежелани реакции, моля обърнете се за инструкции за употреба към Вашия лекар или фармацевт.



Montavit

**Пълна информация се предоставя при поискване на адрес:**

Представителство за България: 1164 София, тел.: 02/866 33 58, 963 11 81,

e-mail: office@montavit.bg | web.montavit.bg